



# PRZYGOTOWANIE DO BADANIA GASTROSKOPII

## » 7 dni przed badaniem:

- ✔ Należy przerwać przyjmowanie preparatów żelaza.
- ✔ Osoby przyjmujące leki antyagregacyjne – typu Aspiryna, Acard, Ticlid, Acesan, Polopiryna, Aclotin, Ticlo, Plavix itp. – powinny przestać je przyjmować po wcześniejszej konsultacji z lekarzem prowadzącym.
- ✔ Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe – Sintrom, Syncumar, Acenocumarol, Warfaryna, Eliquis, Pradaxa, Xarelto – powinny koniecznie skonsultować z lekarzem prowadzącym leczenie przeciwzakrzepowe w celu zamiany tych leków na heparyny drobnocząsteczkowe, np. Clexane, Fraxodi, Fraxiparine, Fragmin, Neoparin.

## » W dniu badania

- ✔ Na 6 godzin przed badaniem nie należy nic jeść, pić kolorowych i gęstych płynów (kawa, soki, mleko, jogurty), palić papierosów, żuć gumy. Dopuszcza się picie niegazowanej wody w ilości nie większej niż 250 ml (1 szklanka) do 3 godzin przed badaniem.
- ✔ Należy zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe. Wyjątek stanowią leki obniżające stężenie glukozy we krwi, stosowane przez osoby z cukrzycą.
- ✔ Osoby chorujące na cukrzycę powinny wykonywać badanie w godzinach porannych. Wówczas pacjent nie przyjmuje leków przeciwcukrzycowych i insuliny w dniu badania, ale przynosi je ze sobą łącznie ze śniadaniem. Będzie mógł je przyjąć ok. 30 minut po badaniu.

## » Po badaniu:

- ✔ Nie należy jeść, pić oraz palić do czasu ustąpienia znieczulenia gardła (zwykle 30-60 minut).

## » Badanie w znieczuleniu dożylnym - analgesedacja:

- ✔ Po podaniu dożylnie środka usypiającego pacjent zasypia na czas badania i budzi się po jego zakończeniu.
- ✔ Po badaniu można jeść dopiero od momentu wskazanego przez anesteziologa.
- ✔ W zależności od decyzji anesteziologa Pacjent przebywa na terenie oddziału od 30 minut do 2 godzin.
- ✔ Z uwagi na zastosowane znieczulenie w trakcie badania - Pacjent musi opuścić oddział pod opieką pełnoletniej osoby towarzyszącej.
- ✔ Nie należy prowadzić pojazdów i podejmować ważnych z punktu prawnego decyzji minimum 12 godzin po znieczuleniu.

☎ 22 23 07 007

www.enel.pl

enel-med

#zdrowiej