



Przygotowanie do badania kolonoskopii

7 dni przed badaniem:

- ✔ Należy przerwać przyjmowanie preparatów żelaza.
- ✔ Osoby przyjmujące leki przeciwplatekcyjne jak: kwas acetylosalicylowy (np. Acard, Polocard, Aspirin Cardio itp.), tiklopidyna (Aclostin), tikagrelor (Brilique), prasugrel (np. Bewim, Efient) i/lub leki przeciwzakrzepowe jak: dabigatran (np. Pradaxa, Telexer, Mirexan, Daxanlo itp.), apiksaban (Eliquis), rywaroksaban (np. Xarelto, Xanirva, Mibrex itp.), acenokumarol (np. Sintrom) warafaryna (Warin), heparyna (np. Clexane, Neoparin, Fragmin, Fraxiparine, Fraxodi) powinny skontaktować się z lekarzem prowadzącym leczenie celem ustalenia sposobu ich dawkowania, potrzeby i czasu odstawienia lub zamiany na inny lek.

5 dni przed badaniem:

- ✔ Nie należy spożywać w żadnej postaci świeżych owoców i warzyw pestkowych, tj. winogron, pomidorów, kiwi, truskawek oraz pestek, siemienia lnianego i maku oraz ziarnistego/ciemnego pieczywa. Pestki i nasiona mogą przykleić się do powierzchni jelita i utrudniać ocenę w trakcie badania.

1-2 dni przed badaniem:

- ✔ Nie należy spożywać świeżych owoców, warzyw, ziarnistego/ciemnego pieczywa i innych produktów z dużą zawartością błonnika. Można spożywać takie produkty jak buliony, kisiele, kleiki, ryż, białe pieczywo, klarowne płyny (herbata, kawa bez mleka, woda niegazowana).

Od momentu rozpoczęcia przygotowania jelita do badania zabronione jest przyjmowanie jakichkolwiek posiłków!

Wodę niegazowaną można pić dodatkowo oprócz preparatu do oczyszczania jelita

- Do 3 godzin przed badaniem w ilości 250 ml (1 szklanka)!

Przygotowanie preparatów

CITRA FLEET

Jedną saszetkę preparatu CitraFleet należy wsypać do 150 ml zimnej wody. Mieszać ok. 2-3 minuty, do rozpuszczenia proszku. Jeżeli się rozgrzeje, należy poczekać, aż ostygnie. Zawiesinę należy wypić dopiero po dokładnym rozpuszczeniu proszku. Picie niegazowanej wody rozpocznij po 10-30 minutach od wypicia rozpuszczonego leku. Konieczne jest wypicie 2 litrów wody po pierwszej dawce rozpuszczonego leku. Wodę koniecznie należy wypić w ciągu 2-3 godzin. Wszystkie wymienione czynności powtórz jeszcze raz używając drugiej saszetki leku CitraFleet. Pełne przygotowanie to wypicie 2 dawek leku i 4 litrów niegazowanej wody (2x2 litry).

EZICLEN

Jedną butelkę preparatu EZICLEN wlewamy do dołączonego kubka i uzupełniamy wodą do kreski zaznaczonej na kubku (0,5 litra). Lek spokojnie wypijamy w przeciągu 30 – 60 minut. Następnie w ciągu godziny wypijamy jeszcze 1 litr wody niegazowanej. W podobny sposób przyjmujemy drugą dawkę leku i wypijamy 1 litr wody.

CLENSIA

Należy przygotować pierwszą porcję leku, rozpuszczając 2 saszetki A i 2 saszetki B w 1 litrze wody i wypić tak przygotowany roztwór w ciągu 1 do 1,5 godziny. Ponadto należy wypić dodatkową porcję co najmniej 0,5 litra wody w ciągu następnej godziny. W podobny sposób przygotowujemy drugą porcję leku.

MOVIPREP

Lek MOVIPREP składa się z dwóch porcji – pierwszą porcję (saszetka A + saszetka B) rozpuszczamy w 1 litrze wody, spokojnie wypijamy w ciągu 1-2 godzin, a w ciągu następnej godziny dopijamy jeszcze 1 litr wody niegazowanej. Tak samo postępujemy z drugą porcją (saszetka A + saszetka B).

FORTTRANS

Należy przygotować 4 litry roztworu preparatu Fortrans, rozpuszczając każdą z 4 saszetek w 1 litrze niegazowanej wody.



22 23 07 007

www.enel.pl

 enel-med



Przygotowanie do badania kolonoskopii

Badanie w godzinach 8.00 – 12.00

PIERWSZĄ PORCJĘ PREPARATU (np. CITRA FLEET, EZICLEN, CLENSIA, MOVIPREP) lub 2 l roztworu FORTTRANS należy wypić od godz. 17.00 do 20.00 w dniu poprzedzającym badanie.

DRUGĄ PORCJĘ PREPARATU (np. CITRA FLEET, EZICLEN, CLENSIA, MOVIPREP) lub 2 l roztworu FORTTRANS należy wypić od godz. 21.00 do 24.00 w dniu poprzedzającym badanie.

Badanie w godzinach 12.00 – 16.00

PIERWSZĄ PORCJĘ PREPARATU (np. CITRA FLEET, EZICLEN, CLENSIA, MOVIPREP) lub 2 l roztworu FORTTRANS należy wypić od godz. 21.00 do 24.00 w dniu poprzedzającym badanie.

DRUGĄ PORCJĘ PREPARATU (np. CITRA FLEET, EZICLEN, CLENSIA, MOVIPREP) lub 2 l roztworu FORTTRANS należy wypić od godz. 06.00 do 09.00 w dniu badania.

Badanie w godzinach 16.00 – 20.00

PIERWSZĄ PORCJĘ PREPARATU (np. CITRA FLEET, EZICLEN, CLENSIA, MOVIPREP) lub 2 l roztworu FORTTRANS należy wypić od godz. 06.00 do 09.00 w dniu badania.

DRUGĄ PORCJĘ PREPARATU (np. CITRA FLEET, EZICLEN, CLENSIA, MOVIPREP) lub 2 l roztworu FORTTRANS należy wypić od godz. 10.00 do 13.00 w dniu badania.

W dniu badania:

- ✔ Pacjent powinien zgłosić się 30 minut przed wyznaczonym terminem do recepcji z dokumentem tożsamości, skierowaniem i aktualnymi badaniami.
- ✔ Pacjent powinien poinformować lekarza o przyjmowanych lekach oraz posiadać ze sobą dokumentację wcześniej wykonanych badań endoskopowych.
- ✔ Jeżeli pacjent przyjmuje leki istotne dla zdrowia – nasercowe, przeciwnadciśnieniowe, antyarytmiczne, tarczycowe, przeciwdrgawkowe, przeciwaśmatyczne – powinien je przyjąć, popijając niewielką ilością (maks. ½ szklanki) niegazowanej wody o godzinie 6.00.
- ✔ Osoby chorujące na cukrzycę powinny wykonywać badanie w godzinach porannych. Wówczas pacjent nie przyjmuje dawek wieczornych leków p/cukrzycowych i insuliny. Nie przyjmuje ich również w dniu badania, ale przynosi je ze sobą łącznie ze śniadaniem. Będzie mógł je przyjąć po badaniu.
- ✔ Nie należy palić papierosów i żuć gumy.

Po badaniu:

- ✔ Po zakończeniu badania można jeść, obowiązuje dieta lekkostrawna. Jeśli pojawi się dyskomfort – wzdęcia, kurczowe bóle brzucha – należy zastosować Espumisan lub No-Spa.

Badanie w znieczuleniu dożylnym – analgesedacja:

- ✔ Po podaniu dożylnie środka usypiającego pacjent zasypia na czas badania i budzi się po jego zakończeniu.
- ✔ Po badaniu można jeść dopiero od momentu wskazanego przez anestezjologa.
- ✔ W zależności od decyzji anestezjologa Pacjent przebywa na terenie oddziału od 30 minut do 2 godzin.
- ✔ Z uwagi na zastosowane znieczulenie w trakcie badania – Pacjent musi opuścić oddział pod opieką pełnoletniej osoby towarzyszącej.
- ✔ Nie należy prowadzić pojazdów i podejmować ważnych z punktu prawnego decyzji minimum 12 godzin po znieczuleniu.